

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

27 JAN 2005

(43) 国際公開日  
2004 年 2 月 5 日 (05.02.2004)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2004/011662 A1(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: C12P 19/14, C07H 11/00, C08B 37/00,  
A61K 31/7024, A61P 9/00, 29/00, 35/04, 37/08, 43/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/000823

(22) 国際出願日: 2003 年 1 月 29 日 (29.01.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願2002-220301 2002 年 7 月 29 日 (29.07.2002) JP(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 大正製薬  
株式会社 (TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)  
[JP/JP]; 〒170-8633 東京都豊島区高田三丁目 2 4 番  
1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 宮坂 昌之  
(MIYASAKA, Masayuki) [JP/JP]; 〒569-1042 大阪  
府高槻市南平台 5-80-11 Osaka (JP). 川島 博人  
(KAWASHIMA, Hiroto) [JP/JP]; 〒333-0866 埼玉県川  
口市芝5097-2-1302 Saitama (JP).(74) 代理人: 細田 芳徳 (HOSODA, Yoshinori); 〒540-6591  
大阪府大阪市中央区大手前一丁目 7 番 3 1 号 OMM  
ビル 5 階 私書箱 2 6 号 細田国際特許事務所内 Osaka  
(JP).

(81) 指定国 (国内): CA, US.

添付公開書類:  
— 国際調査報告書2 文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PERSULFATED OLIGOSACCHARIDE ACTING ON SELECTINS AND CHEMOKINE

(54) 発明の名称: セレクチン及びケモカインに作用する過硫酸化オリゴ糖

(57) Abstract: A persulfated oligosaccharide acting on selectins and chemokine. Namely, a saccharide compound interacting with L-selectin, P-selectin and chemokine; medicinal compositions and remedies or preventives for diseases the onset of which relates to biological phenomena mediated respectively by L-selectin, P-selectin and chemokine.

(57) 要約: セレクチン及びケモカインに作用する過硫酸化オリゴ糖。本発明によれば、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインに相互作用する糖化合物、医薬組成物、並びにL-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれにより介される生物学的事象が発症に関連する疾患の治療又は予防剤が提供される。

BEST AVAILABLE COPY



WO 2004/011662 A1

## 明細書

### セレクチン及びケモカインに作用する過硫酸化オリゴ糖

#### 技術分野

本発明は、セレクチン及びケモカインに作用する過硫酸化オリゴ糖に関する。具体的には、本発明は、向炎症分子であるＬ－セレクチン、Ｐ－セレクチン及びケモカインに相互作用する糖化合物並びにＬ－セレクチン、Ｐ－セレクチン及びケモカインのそれぞれにより介される生物学的事象が発症に関連する疾患の治療又は予防剤に関する。より詳しくは、本発明は、Ｌ－セレクチン、Ｐ－セレクチン、ケモカイン等に介される生物学的事象が発症に関連する疾患の治療若しくは予防剤、該治療若しくは予防薬の創薬のためのリード化合物、又は該リード化合物のデザイン等に有用な糖化合物、並びに炎症性疾患、アレルギー性疾患、癌転移、心筋障害、多臓器不全等の疾患の治療又は予防に有用な治療又は予防剤に関する。

#### 背景技術

炎症は、白血球上の接着分子と血管内皮細胞との接着を促進する分子により誘発され、特定の接着分子が関与することが知られている。前記接着分子としては、例えば、Ｌ－セレクチン、Ｐ－セレクチンに代表されるセレクチンファミリー等が挙げられる。

前記Ｌ－セレクチン又はＰ－セレクチンと、そのリガンドとの相互作用において、該リガンドの硫酸化は、重要な役割を果たすことが知られている。例えば、Ｐ－セレクチン糖タンパク質リガンド－１のチロシン硫酸化は、該Ｐ－セレクチン糖タンパク質リガンド－１と、Ｌ－セレクチン及びＰ－セレクチンのそれぞれとの相互作用に必要とされることが知られている [サコ(Sako, D.)ら、Cell, 83

, 323-331 (1995); ポウヤニ(Pouyani, T.) ら、Cell, 83, 333-343 (1995); 及びスピルチーニ(Spertini, O.) ら、J. Cell Biol., 135, 523-531 (1996)]。

また、高内皮性小静脈上のL-セレクチンのリガンドは、硫酸化依存性様式でL-セレクチンに結合することが知られている [イマイ(Imai, Y.) ら、Nature, 361, 555-557 (1993); ヒラオカ(Hiraoka, N.) ら、Immunity, 11, 79-89 (1999); ビストラップ(Bistrup, A.) ら、J. Cell Biol., 145, 899-910 (1999)]。さらに、HNK-1 反応性スルホグルクロニル糖脂質 [ニードハム(Needham, L. K.) ら、Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 90, 1359-1363 (1993)]、ヘパリンオリゴ糖 [ネルソン(Nelson, R. M.) ら、Blood, 11, 3253-3258 (1993)] 及びヘパリン硫酸グリコサミノグリカン [ケニック(Koenig, A.) ら、J. Clin. Invest., 101, 877-889 (1998)] は、L-セレクチン及びP-セレクチンのそれぞれに結合することが知られている。

しかしながら、L-セレクチン及びP-セレクチンのそれぞれに結合する化合物は、いずれも高分子量であり、L-セレクチン、P-セレクチン等とリガンドとの結合を調節するリード化合物のデザインは、困難であり、いまだ、医薬品として開発に成功していないのが現状である。


## 発明の開示

本発明は、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれとそのリガンドとの結合を調節すること、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれに介される生物学的事象を調節すること、並びに該生物学的事象が発症に関連する疾患の症状を改善すること、該疾患の治療又は予防剤のためのリード化合物を提供すること等を達成する糖化合物を提供することを目的とする。また、本発明は、炎症性疾患、アレルギー疾患、癌転移、心筋障害、多臓器不全等の疾患の症状を改善し、生体において高い親和性を呈する、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれにより介される生物学的事象が

発症に関連する疾患の治療又は予防剤を提供することを目的とする。

即ち、本発明は、


〔1〕 一般式 (I) :



(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  及び  $R^4$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示す)

又は、


一般式 (II) :



(式中、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  及び  $R^8$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示す)

で表わされる糖化合物、


〔2〕 一般式 (III) :



(式中、 $R^9$  及び  $R^{10}$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示し、 $m$  は、3 又は 4 である)

又は、

一般式 (IV) :



(式中、 $R^{11}$  及び  $R^{12}$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示し、 $n$  は、3 又は 4 である)

で表わされる糖化合物、

〔3〕 前記〔1〕又は〔2〕記載の糖化合物を有効成分として含有してなる、医薬組成物、並びに

〔4〕 前記〔1〕又は〔2〕記載の糖化合物を有効成分として含有してなる、  
L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれにより介される生物学的現象が発症に関連する疾患の治療又は予防剤、  
に関する。

#### 図面の簡単な説明

第1図は、バーシカン中のコンドロイチン硫酸／デルマタン硫酸鎖と、L-セレクチン、P-セレクチン及びCD44のそれぞれとの相互作用における硫酸化の影響について、免疫沈降で調べた結果を示す図である。

第2図は、バーシカンと、L-セレクチン、P-セレクチン及びCD44のそれぞれとの結合における過硫酸化CS/DS鎖の影響について、酵素結合免疫吸着定量法で調べた結果を示す図である。第2図中、十字は、ケラタン硫酸、白三

角は、コンドロイチン、白四角は、コンドロイチン硫酸A、白丸は、コンドロイチンポリ硫酸、黒三角は、デルマタン、黒四角は、デルマタン硫酸、黒丸-実線は、デルマタンポリ硫酸、黒丸-点線は、コンドロイチン硫酸Eを示す。また、第2図中、パネルAは、バーシカンとL-セレクチンとの結合に関する結果である、パネルBは、バーシカンとP-セレクチンとの結合に関する結果である、パネルCは、バーシカンとCD44との結合に関する結果である。

第3図は、バーシカン由来グリコサミノグリカンの二糖組成を示す図である。パネルAは、コンドロイチナーゼABCにより処理し、2-アミノベンズアミド(2-AB)で誘導体化されたバーシカン由来グリコサミノグリカンの二糖組成解析の結果を示し、パネルBは、コンドロ-6-スルファターゼとコンドロイチナーゼABCとにより処理し、2-ABで誘導体化されたバーシカン由来グリコサミノグリカンの二糖組成解析の結果を示す。また、第3図中、0Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-0S$ 、4Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-4S$ 、6Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-6S$ 、 $diS_D$ は、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-di(2, 6)S$ 、 $diS_E$ は、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-di(4, 6)S$ 、UA2Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-UA2S$ の溶出位置を示す。

第4図は、バーシカンとケモカインとの相互作用における硫酸化の影響を調べた結果を示す図である。パネルAは、2-アミノベンズアミドで誘導体化した産物の二糖組成を示し、0Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-0S$ 、4Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-4S$ 、6Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-6S$ 、 $diS_D$ は、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-di(2, 6)S$ 、 $diS_E$ は、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-di(4, 6)S$ の溶出位置を示す。パネルBは、バーシカンとケモカインとの相互作用における硫酸化の影響について、酵素結合免疫吸着定量法で調べた結果を示し、BSAは、ウシ血清アルブミン、2B1は、抗バーシカンモノクローナル抗体2B1、L-Igは、L-セレクチン-Ig、E-Igは、E-セレクチン-Ig、P-Igは、P-セレクチン-Ig、SLCは、

二次リンパ様組織ケモカイン、SLC-Tは、C末端切形型二次リンパ様組織ケモカイン、IP-10は、 $\gamma$ -インターフェロン誘導性タンパク質-10、PF4は、血小板因子4、SDF-1 $\beta$ は、間質細胞由来因子-1 $\beta$ 、SDF-1 $\alpha$ は、間質細胞由来因子-1 $\alpha$ を示す。パネルBにおける各バーは、4連の測定の平均±標準偏差を示し、黒バーは、非処理馴化培地由来バーシカン、斜線バーは、塩素酸ナトリウム処理馴化培地についての結果である。各バーは、4連の測定の平均±標準偏差を示す。

第5図は、バーシカンとケモカインとの結合における過硫酸化CS/DS鎖の影響について、酵素結合免疫吸着定量法で調べた結果を示す図である。横軸の表記は、第4図と同様である。また、各レーン中、バー1は、グリコサミノグリカン非存在下における結果、バー2は、コンドロイチン、バー3は、コンドロイチン硫酸A、バー4は、コンドロイチンポリ硫酸、バー5は、デルマタンポリ硫酸、バー6は、コンドロイチン硫酸Eを示す。各バーは、3連の測定の平均±標準偏差を示す。

第6図は、固定化グリコサミノグリカンと、ケモカイン、L-セレクトリン及びCD44それぞれとの相互作用を記録したBIAcoreのセンサーグラムを示す。第6図中、SLCは、二次リンパ様組織ケモカインを、IP-10は、 $\gamma$ -インターフェロン誘導性タンパク質-10を、SDF-1 $\beta$ は、間質細胞由来因子-1 $\beta$ を示し、CS Eは、コンドロイチン硫酸Eを、CS Aは、コンドロイチン硫酸Aを示す。第6図中、共鳴単位での応答を時間の関数として記録した。

第7図は、L-セレクトリン、P-セレクトリン及びケモカインのそれぞれと相互作用する断片の構造を同定した結果を示す図である。パネルAは、コンドロイチン硫酸A（図中、CS A）、コンドロイチン硫酸C（図中、CS C）及びコンドロイチン硫酸E（図中、CS E）のそれぞれのヒアルロニダーゼ消化産物のHPLCによるクロマトグラムを示す。パネルBは、画分a、画分c、画分e


－ 1 及び画分 e－ 2 のそれぞれの二糖組成を示す。パネル C は、画分 a、画分 c、画分 e－ 1 及び画分 e－ 2 のそれぞれの構造の模式図であり、黒三角は、G1cA、斜線丸は、Ga1NAc、4S は、4－O－硫酸化、6S は、6－O－硫酸化、 $\beta$ 3 は、 $\beta$ 1－3 結合、 $\beta$ 4 は、 $\beta$ 1－4 結合を表わす。パネル D は、画分 a、画分 c、画分 e－ 1 及び画分 e－ 2 のそれぞれに含まれるオリゴ糖と、L－セレクチン、P－セレクチン、CD44 及びケモカインのそれぞれとの相互作用を調べた結果を示し、横軸の表記は、前記第 4 図と同様である。また、各レーン中、バー 1 は、ストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼを用いた場合の結果、バー 2 は、ビオチン化画分 a 結合ストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼを用いた場合の結果、バー 3 は、ビオチン化画分 c 結合ストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼを用いた場合の結果、バー 4 は、ビオチン化画分 e－ 1 結合ストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼを用いた場合の結果、バー 5 は、ビオチン化画分 e－ 2 結合ストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼを用いた場合の結果を示す。各バーは、4 連の測定の前平均土標準偏差を示す。

第 8 図は、ケモカイン活性に対する過硫酸化 CS/D S 鎖の影響を調べた結果を示す図である。第 8 図中、SLC は、二次リンパ様組織ケモカイン、SLC－T は、C 末端切形型二次リンパ様組織ケモカイン、CS E は、コンドロイチン硫酸 E、CS A は、コンドロイチン硫酸 A を示す。また、第 8 図中、矢頭は、刺激を与えた時点を示す。

発明を実施するための最良の形態

本発明は、硫酸化グリコサミノグリカンのうち、一般式(III')：






(式中、 $R^{13}$ 及び $R^{14}$ は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示し、 $k$ は、任意の自然数である)

の二糖部分、又は

一般式(IV') :



(式中、 $R^{15}$ 及び $R^{16}$ は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示し、 $1$ は、任意の自然数である)


の二糖部分

を構成単位として含有する糖化合物、特に、 $G1cA\beta1-3GalNAc(4,6-O-ジスルフェート)$ を繰返し単位とする四糖化合物又は $IdoA\alpha1-3GalNAc(4,6-O-ジスルフェート)$ を繰返し単位とする四糖化合物が、 $L$ -セレクチン、 $P$ -セレクチン及びケモカインのそれぞれと相互作用するという驚くべき知見、及び前記四糖化合物が、ケモカインの生理活性等を阻害するという驚くべき知見に基づく。

なお、本明細書において、「 $G1cA$ 」は、 $D$ -グルクロン酸残基を示し、「 $GalNAc$ 」は、 $N$ -アセチル- $D$ -ガラクトサミン残基を示し、「 $IdoA$ 」は、 $L$ -イズロン酸残基を示し、「 $HexA$ 」は、ヘキスロン酸残基を示す。

また、「 $\beta 1-3$ 」は、 $\beta 1-3$ 結合を意味し、「 $\alpha 1-3$ 」は、 $\alpha 1-3$ 結合を意味する。


本発明の糖化合物としては、一般式 (I) :



(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  及び  $R^4$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示す)


又は

一般式 (II) :



(式中、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  及び  $R^8$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示す)

で表わされる糖化合物、及び一般式 (III) :




(式中、 $R^9$  及び  $R^{10}$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示し

、mは、3又は4である)

又は

一般式 (IV) :



(式中、 $R^{11}$ 及び $R^{12}$ は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示し、 $n$ は、3又は4である)

で表わされる糖化合物である。本発明の糖化合物は、四糖～八糖からなる化合物であるにもかかわらず、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれと相互作用し、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれが関連する生理的機能等を調節することができるという優れた効果を発揮する。また、本発明の糖化合物は、その製造の際、簡便に製造することができる。さらに、本発明の糖化合物は、四糖～八糖からなる化合物であるため、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインからなる群より選ばれた少なくとも1種と、そのリガンドとの結合を調節しうる低分子化合物として、あるいはそのリード化合物のデザインのための基礎として用いることができるという優れた効果を発揮する。また、本発明の糖化合物によれば、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれとそのリガンドとの結合を調節することができ、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれに介される生物学的事象を調節することができ、該生物学的事象が発症に関連する疾患の症状を改善することができ、該疾患の治療又は予防剤のためのリード化合物を提供することができる。

本発明においては、分子量の観点から、特に、前記一般式 (I) 又は一般式 (

II) で表わされる糖化合物が好ましい。

前記一般式 (I) において、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  及び  $R^4$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示す。また、前記スルホン酸基は、本発明の目的を阻害しないものであれば、置換基を有していてもよい。前記一般式 (I) の任意の  $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  及び  $R^4$  がスルホン酸基である糖化合物は、例えば、三酸化イオウートリアルキルアミン複合体、三酸化イオウーピリジン複合体、硫酸ートリアルキルアミン複合体又は硫酸ーピリジン複合体により得られうる。

また、前記一般式 (II) において、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  及び  $R^8$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示す。また、前記スルホン酸基は、本発明の目的を阻害しないものであれば、置換基を有していてもよい。前記一般式 (II) の任意の  $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  及び  $R^8$  がスルホン酸基である化合物は、例えば、三酸化イオウートリアルキルアミン複合体、三酸化イオウーピリジン複合体、硫酸ートリアルキルアミン複合体又は硫酸ーピリジン複合体により得られうる。

さらに、前記一般式 (III) において、 $R^9$  及び  $R^{10}$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示す。また、前記スルホン酸基は、本発明の目的を阻害しないものであれば、置換基を有していてもよい。前記一般式 (III) において、 $R^9$  及び／又は  $R^{10}$  がスルホン酸基である化合物は、例えば、三酸化イオウートリアルキルアミン複合体、三酸化イオウーピリジン複合体、硫酸ートリアルキルアミン複合体又は硫酸ーピリジン複合体により得られうる。

また、前記一般式 (IV) において、 $R^{11}$  及び  $R^{12}$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示す。また、前記スルホン酸基は、本発明の目的を阻害しないものであれば、置換基を有していてもよい。前記一般式 (IV) において、 $R^{11}$  及び／又は  $R^{12}$  がスルホン酸基である化合物は、例えば、三酸化イオウートリアルキルアミン複合体、三酸化イオウーピリジン複合体、硫酸ートリアルキルアミン複合体又は硫酸ーピリジン複合体により得られうる。

本発明の糖化合物としては、具体的には、 $G1cA\beta1-3Ga1NAc(4$

, 6-O-ジスルフェート)  $\beta 1-4 \text{GlcA} \beta 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-スルフェート)、 $\text{IdoA} \alpha 1-3 \text{GlcNAc}$  (4, 6-O-ジスルフェート)  $\beta 1-4 \text{IdoA} \alpha 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-ジスルフェート)、 $\text{GlcA} \beta 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-ジスルフェート)  $\beta 1-4 \text{GlcA} \beta 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-スルフェート)  $\beta 1-4 \text{GlcA} \beta 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-スルフェート)、 $\text{IdoA} \alpha 1-3 \text{GlcNAc}$  (4, 6-O-スルフェート)  $\beta 1-4 \text{IdoA} \alpha 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-ジスルフェート)  $\beta 1-4 \text{IdoA} \alpha 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-ジスルフェート)、 $\text{GlcA} \beta 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-ジスルフェート)  $\beta 1-4 \text{GlcA} \beta 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-スルフェート)  $\beta 1-4 \text{GlcA} \beta 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-スルフェート)、 $\text{IdoA} \alpha 1-3 \text{GlcNAc}$  (4, 6-O-ジスルフェート)  $\beta 1-4 \text{IdoA} \alpha 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-ジスルフェート)  $\beta 1-4 \text{IdoA} \alpha 1-3 \text{GalNAc}$  (4, 6-O-ジスルフェート) 等が挙げられる。また、前記糖化合物のなかでも、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインとの相互作用を十分に発揮させる観点から、硫酸化の度合いが高い化合物であることが望ましい。

本発明の糖化合物は、例えば、

(a) イカ軟骨 [スズキ(Suzuki, S.)ら、J. Biol. Chem., 243, 1543-1550 (1968)]、肥満細胞 [カツツ(Katz, H. R.)ら、J. Biol. Chem., 261, 13393-13396 (1986); 及びスティーブンス(Stevens, R. L.)ら、Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 85, 2284-2287 (1988)]、好中球 [オオハシ(Ohhashi, Y.)ら、Biochem. J., 217, 199-207 (1984); 及びピーターソン(Petersen, F.)ら、J. Biol. Chem., 274, 12376-12382 (1999)]、単球 [ウーリン-ハンセン(Uhlin-Hansen, L.)ら、J. Biol. Chem., 264, 14916-14922 (1989); マックジー(McGee, M. P.)ら、

J. Biol. Chem., 270, 26109-26115 (1995)]、糸球体 [コバヤシ(Kobayashi, S.)ら、Biochim. Biophys. Acta, 841, 71-80 (1985)]、糸球体間質細胞 [(Yaoita, E.)ら、J. Biol. Chem., 265, 522-531 (1990)]等に見出される過硫酸化コンドロイチン硫酸／デルマタン硫酸鎖を、例えば、ヒアルロニダーゼで消化する工程、及び

(b) 前記工程 (a) で得られた消化産物を高速液体クロマトグラフィーに供して、オリゴ糖画分を得る工程、  
を行なうことにより得られうる。

前記工程 (a) において、過硫酸化コンドロイチン硫酸／デルマタン硫酸鎖は、慣用の手法により得られうる。また、前記過硫酸化コンドロイチン硫酸／デルマタン硫酸鎖の供給源は、前述の例示に特に限定されるものではなく、過硫酸化コンドロイチン硫酸／デルマタン硫酸鎖を保持する他の生物、組織、細胞等であってもよい。

ついで、工程 (b) において、前記 (a) で得られた消化産物を、クロマトグラフィー、例えば、高速液体クロマトグラフィーに供する。工程 (b) においては、単一種類のオリゴ糖を、単一ピークとして得られるように、慣用の各種クロマトグラフィーを行なえばよい。例えば、イカ軟骨由来コンドロイチンA、イカ軟骨由来コンドロイチンC及びイカ軟骨由来コンドロイチンEの場合、前記クロマトグラフィーとして、16 mM～1 M  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  のリニアグラジェントによるアミン結合シリカゲルカラムクロマトグラフィーと、つづくゲル濾過カラムクロマトグラフィーとの組合せ等が行なわれうる。ここで、クロマトグラフィーに用いられる溶液は、前記オリゴ糖等を分離するのに適した水溶液又は水溶性有機溶媒と水との混合溶液であればよい。

前記工程 (b) により得られた糖化合物を三酸化イオウートリアルキルアミン複合体、三酸化イオウーピリジン複合体、硫酸ートリアルキルアミン複合体又は硫酸ーピリジン複合体により硫酸化することもできる。特に、コンドロイチン硫

酸の 6-O-硫酸化、デルマタン硫酸の 6-O-硫酸化は、好ましくは、ナガサワらの方法 [ナガサワ (Nagasawa, K.) ら, Carbohydr. Res., 158, 183-190 (1986)]; その全ての教示は、参照により本明細書に取り込まれる] により行なうことが望ましい。

本発明の糖化合物は、

- ① L-セレクトリン、P-セレクトリン及びケモカインのそれぞれと相互作用、例えば、結合する;
  - ② パーシカンと、L-セレクトリン、P-セレクトリン及びケモカインのそれぞれの結合を調節、具体的には、阻害する;
  - ③ ケモカインの生理活性を阻害する
- という性質を発現する。

そのため、本発明の糖化合物は、L-セレクトリン、P-セレクトリン及びケモカインのそれぞれにより介される生物学的事象が発症に関連する疾患の治療又は予防への応用が期待される。

したがって、本発明により、本発明の糖化合物を有効成分として含有した医薬組成物が提供される。前記医薬組成物には、適用対象となる疾患、該疾患の状態、投与対象となる個体、器官、局所部位、組織等に応じて、前記有効成分を安定に維持しうる担体（薬学的に許容されうる担体）、薬学的に許容されうる助剤、賦形剤、結合剤、安定剤、緩衝剤、溶解補助剤、等張剤等をさらに含有してもよい。

本発明の医薬組成物中の有効成分の含有量は、適用対象となる疾患、該疾患の状態、投与対象となる個体、器官、局所部位、組織等に応じて、適宜設定され得、例えば、後述の治療又は予防剤と同様に設定されうる。

さらに、本発明の医薬組成物の評価も、後述の治療又は予防剤の場合と同様に行なわれうる。

さらに、本発明により、L-セレクトリン、P-セレクトリン及びケモカインのそ

れぞれにより介される生物学的事象が発症に関連する疾患の治療又は予防剤が提供される。

本発明の治療又は予防剤は、本発明の糖化合物を有効成分として含有することに1つの特徴がある。

前記「L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれが介する生物学的事象」としては、例えば、炎症における組織浸潤、サイトカイン産生調節、リンパ球ホーミング、血小板凝集、腫瘍巣の血管新生、癌転移、心筋虚血再灌流障害等が挙げられる。また、前記疾患としては、炎症性疾患、感染症、喘息、アレルギー性炎症、間質性肺炎、全身性炎症反応症候群、炎症性疾患等が挙げられる。

本発明の治療又は予防剤によれば、本発明の糖化合物を有効成分として含有するため、例えば、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれと相互作用して、炎症性疾患における炎症の誘因、例えば、前記L-セレクチン及び／又はP-セレクチンを介した白血球と血管内皮細胞との接着を調節、具体的には阻害すること、及びケモカインの生理活性（サイトカイン産生調節、 $Ca^{2+}$ 動員等）を調節、具体的には、阻害することができるという優れた効果を発揮する。また、本発明の治療又は予防剤によれば、本発明の糖化合物を有効成分として含有するため、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインからなる群より選ばれた少なくとも1種とそのリガンドとの結合を調節することができる。したがって、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれを介した生物学的事象が関連する炎症性疾患、アレルギー疾患、癌転移を治療、症状を抑制又は予防することができるという優れた効果を発揮する。すなわち、本発明の治療又は予防剤は、抗炎症剤、抗アレルギー剤、抗癌剤等として使用されうる。さらに、本発明の治療又は予防剤によれば、炎症性疾患、アレルギー性疾患、癌転移、心筋障害、多臓器不全等の疾患の症状を改善し、生体において高い親和性を呈するという優れた性質を発現する。そのため、L-セレクチン、P-セレク



チン及びケモカインのそれぞれにより介される生物学的事象が発症に関連する疾患の症状を改善することができるという優れた効果を奏する。

本発明の治療又は予防剤の評価は、例えば、下記のように行なわれうる。

本発明の治療又は予防剤の作用、例えば、結合阻害能は、例えば、以下のよう  
に、表面プラズモン共鳴解析等により評価されうる。すなわち、本発明の治療又は  
は予防剤の作用は、

(i) L-セ렉チン、P-セ렉チン又はケモカインをセンサーチップ上に固定し、L-セ렉チン固定化センサーチップ、P-セ렉チン固定化センサーチップ及びケモカイン固定化センサーチップのそれぞれを得るステップ、

(ii) 本発明の治療又は予防剤の存在下、L-セ렉チン、P-セ렉チン及びケモカインのそれぞれのリガンドを、一定の流速で、前記リガンドに対応して、L-セ렉チン固定化センサーチップ、P-セ렉チン固定化センサーチップ及びケモカイン固定化センサーチップのいずれかに負荷するステップ、及び

(iii) 適切な検出手段〔例えば、光学的検出（蛍光度、蛍光偏向度等）、質量分析計との組み合わせ（マトリックス支援レーザー脱離イオン化-飛行時間型質量分析計:MALDI-TOF MS、エレクトロスプレー・イオン化質量分析計:ESI-MS等）〕により、光学的変動又は質量の変動として相互作用を検出し、それにより、センサーグラムを得るステップ

を含む評価方法を行なうことにより評価されうる。

なお、前記ステップ(i)において、リガンドをセンサーチップに固定化してもよく、この場合、ステップ(ii)において、治療又は予防剤の存在下、L-セ렉チン、P-セ렉チン及びケモカインのいずれかを、一定の流速で、対応するリガンド固定化センサーチップ上に負荷すればよい。

前記評価方法においては、本発明の治療又は予防剤の非存在下、L-セ렉チン、P-セ렉チン及びケモカインのそれぞれと、そのリガンドとの複合体の形成を示すセンサーグラムが提示された場合、例えば、光学的センサーグラム又は

質量センサーグラムが、送液によるリガンドの導入により変動した場合を陰性対照とする。したがって、本発明の治療又は予防剤による結合の阻害は、本発明の治療又は予防剤の非存在下の場合と同様の反応系で、本発明の治療又は予防剤の存在下、複合体の形成を示すセンサーグラムが提示されない場合又は複合体の形成までの時間が遅延した場合を指標とする。

本発明の治療又は予防剤の作用、例えば、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれに介される生物学的事象の調節は、本発明の治療又は予防剤の存在下における培養細胞中の生物学的事象の有無、程度を測定することにより評価されうる。例えば、二次リンパ様組織ケモカインが介する $Ca^{2+}$ 動員に関し、

- i) L1.2/CCR7細胞( $1 \times 10^6$  細胞/ml)を、Fura-2で負荷し、本発明の治療又は予防剤( $100 \mu g/ml$ )の存在下又は非存在下に、二次リンパ様組織ケモカインで刺激するステップ、及び
- ii) ヒロセ(Hirose, J.)ら〔J. Biol. Chem., 276, 5228-5234 (2001) ; その全ての教示は、参照により本明細書に取り込まれる〕の記載に従い、蛍光率を測定することにより、細胞内カルシウム濃度をモニターするステップ、を含む評価方法を行なうことにより評価されうる。

さらに、本発明の治療又は予防剤の作用、例えば、生体における炎症性疾患の治療又は予防効果は、炎症疾患モデル動物に、本発明の治療又は予防剤を投与し、炎症部位における症状の変化を観察すること、好中球浸潤を組織ミエロパーオキシダーゼの活性を指標として検出すること等により評価されうる。

本発明の治療又は予防剤の剤形としては、投与形態に応じて適宜選択することができ、例えば、錠剤等の経口投与剤；スプレー剤、軟膏等の外用薬；皮下、皮内、筋肉内、静脈内等への注射剤等が挙げられる。

したがって、本発明の治療又は予防剤中における有効成分の含有量は、前記疾患の治療又は予防を必要とする個体の年齢、体重、病態等に応じて、適宜設定す

ることができ、例えば、投与形態が、静脈注射の場合、10～500mg、皮下注射の場合、10～500mgであることが望ましい。

また、個体への本発明の治療又は予防剤の投与量は、前記疾患の治療又は予防を必要とする個体の年齢、体重、病態等に応じて、適宜設定することができ、例えば、有効成分の量として、 $1\mu\text{g}/\text{kg}$ （個体の体重）～ $10\text{mg}/\text{kg}$ （個体の体重）、好ましくは、 $100\mu\text{g}/\text{kg}$ （個体の体重）～ $10\text{mg}/$ （個体の体重） $\text{kg}$ 、より好ましくは、 $1\text{mg}/$ （個体の体重） $\text{kg}$ ～ $8\text{mg}/$ （個体の体重） $\text{kg}$ であることが望ましい。

本発明の治療又は予防剤は、L-セ렉チン、P-セ렉チン及びケモカインのそれぞれに介される生物学的事象が発症に関連する疾患の状態、投与対象となる個体、器官、局所部位、組織等に応じて、薬学的に許容されうる助剤、賦形剤、結合剤、安定剤、緩衝剤、溶解補助剤、等張剤等をさらに含有してもよい。

また、本発明の治療又は予防剤は、前記有効成分を安定に維持しうる担体（薬学的に許容されうる担体）に該有効成分を担持させて得られた剤であってもよい。具体的には、例えば、投与対象となる個体、器官、局所部位、組織等の生体への導入を容易にしうる薬学的に許容されうる担体に、有効成分を保持させてもよい。

さらに、本発明により、L-セ렉チン、P-セ렉チン及びケモカインのそれぞれを介した生物学的事象に関連する疾患の治療又は予防方法、具体的には、例えば、炎症性疾患、アレルギー疾患、癌転移、心筋障害、多臓器不全等を治療、症状を抑制又は予防する方法が提供される。本発明の治療又は予防方法は、前記治療又は予防剤の投与形態、投与量に準じて実施されうる。

以下、本発明を実施例等により詳細に説明するが、本発明は、かかる実施例等により限定されるものではない。なお、本実施例に用いられた試薬は、特に記載しないかぎり、カワシマ(Kawashima, H.)ら[J. Biol. Chem., 275, 35448-3545

6 (2000)] 及びヒロセ(Hirose, J.)ら[J. Biol. Chem., 276, 5228-5234 (2001)] に記載の試薬と同様である。また、細胞の培地組成等については、フレッシュニー(Frshney, R. Ian)、カルチャー・オブ・アニマルセルズ・ア・マニュアル・オブ・ベーシック・テクニク、第2版(Culture of animal cell A manual of basic technique, 2nd ed.)、Alan R. Liss. Inc., 66-84 (1987)等が参照され、その全ての教示が本明細書に取り込まれる。

#### 実施例 1

硫酸化の代謝インヒビターである塩素酸ナトリウムでACHN細胞を処理することにより、パーシカン中のコンドロイチン硫酸／デルマタン硫酸鎖（以下、CS／DS鎖とも表記する）と、L-セ렉チン、P-セ렉チン及びCD44のそれぞれとの相互作用における硫酸化の必要性を検討した。

##### (1) ヒトCD44-Igの作製

ヒト由来CD44 cDNAを、センスプライマー（配列番号：1）：

5'-TTTAAGCTTATGGACAAGTTTGGTGGCAC-3' （配列番号：1）

（太字部分は、HindIII制限酵素認識部位であり、下線部は、ヒトCD44の最初の7アミノ酸のコドンである）と、アンチセンスプライマー（配列番号：2）：

5'-TTTTCTAGAAACACGTCATCATCAGTAGGGTT-3' （配列番号：2）

（太字部分は、XbaI制限酵素認識部位であり、下線部は、ヒトCD44の172～178位のアミノ酸のコドンである）とを用いたPCRにより調製した。得られた増幅産物を、発現ベクターpcDNA3.1/Myc-His(+)B

【インビトロジェン(Invitrogen)社製】のクローニングサイトに挿入し、ヒトCD44発現ベクターを得た。また、前記増幅産物について、配列決定した。

製造者の説明書に従って、LipofectAMINE™試薬〔インビトロジェン (Invitrogen) 社製〕を用い、前記ヒトCD44発現ベクターを293T細胞にトランスフェクトした。得られたトランスフェクト細胞を、20重量%ウシ胎仔血清を含むダルベッコ改変イーグル培地中、CO<sub>2</sub> インキュベーター内で、37℃で4日間細胞を培養し、馴化培地を得た。

その後、前記馴化培地を、抗CD44モノクローナル抗体BRIC 235結合CNBr活性化セファロース4Bでのイムノアフィニティークロマトグラフィーに供して、単量体CD44を得た。得られた可溶性CD44を、SDS-PAGE及び銀染色に供した。その結果、得られた可溶性CD44の純度は、95%を超える純度であった。

ついで、得られたCD44を用い、トヤマ-ソリマチ (Toyama-Sorimachi, N.) ら [J. Biol. Chem., 270, 7437-7444, (1995); その全ての教示が参照により本明細書に取り込まれる] に記載の方法に従って、ヒトCD44-イムノグロブリン (Ig) を作製した。

(2) [<sup>35</sup>S] 硫酸ナトリウム又は [<sup>35</sup>S] メチオニンを用いたACHN細胞の代謝標識

10重量% ウシ胎仔血清を含むRPMI 1640中、30mM 塩素酸ナトリウムの存在下又は非存在下に、ACHN細胞を、37℃で6時間ブレインキュベートした。得られたACHN細胞のコンフルエントな単層を、

(i) 0.2mCi/mlの [<sup>35</sup>S] Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>〔商品名: Sulfur-35; アイシーエヌ ラジオケミカルズ (ICN Radiochemicals) 社製〕の存在下、2重量% 透析ウシ胎仔血清を含むイーグル最少基本培地SEM〔硫酸不含; バイオウィッターカー (BioWhittaker) 社製〕、又は

(ii) 0.2mCi/mlの [<sup>35</sup>S] -メチオニン〔アイシーエヌ ラジオケ

ミカルズ (ICN Radiochemicals) 社製] の存在下、2 重量%  
透析ウシ胎仔血清を含むメチオニン不含RPMI 1640培地〔インビトロ  
ジェン (Invitrogen) 社製〕  
のいずれかの培地中、30mM 塩素酸ナトリウムの存在下又は非存在下、18  
時間インキュベートして標識した。

### (3) 免疫沈降

緩衝液A (0.05% Tween 20, 20mM HEPES-NaOH,  
0.15M NaCl, 1mM CaCl<sub>2</sub>, 1mM MgCl<sub>2</sub>, pH6.  
8) を用いて、ビーズを洗浄したことを除き、カワシマ (Kawashima, H) らの文献  
[Int. Immunol., 11, 393-405 (1999) ; その全ての教示が参照により本明細書  
に取り込まれる] に記載の方法に従い、以下のように免疫沈降を行なった。

第1図に示された抗体及びIgキメラのそれぞれ (10 $\mu$ g 相当量) と、プ  
ロテインA-セファロースカラム (10 $\mu$ l 相当量) とを、慣用の方法により  
結合させ、抗体結合プロテインA-セファロース又はIgキメラ結合プロテイン  
A-セファロースを得た。ついで、前記緩衝液A 1ml中、各抗体結合プロテ  
インA-セファロース又は各Igキメラ結合プロテインA-セファロース (10  
 $\mu$ l ゲル相当量) と、馴化培地とを、4 $^{\circ}$ Cで一晩インキュベートした。なお、  
抗バーシカンポリクローナル抗体である抗D [ツィーママン (Zimmermann, D. R.  
) ら, J. Cell. Biol., 124, 817-825 (1994)] は、ディーテル R. ツィマー  
マン博士 (Institute of Clinical Pathology,  
University of Zurich) により提供されたものであり  
、ヒトL-セレクチン-Igは、アールアンドディー システムズ インコーポ  
レーティド (R&D Systems Inc) 製である。

その後、前記ビーズを、前記緩衝液Aで洗浄し、沈殿物を得た。得られた沈殿  
物を、SDS-アガロース-PAGEに供し、ついで、ゲル上の<sup>35</sup>S標識に由来

するシグナルをオートラジオグラフィーで検出した。その結果を第1図に示す。

第1図のレーン5～8に示すように、バーシカンのコアタンパク質は、合成されたものの、レーン1～4に示されるように、塩素酸ナトリウムによる処理により、未処理の場合に対して、90%を超える硫酸化の阻害をもたらした。

また、第1図のレーン11、12、15及び16に示されるように、前記塩素酸ナトリウム処理により、バーシカンと、L-セ렉チン-Ig及びP-セ렉チン-Igのそれぞれとの相互作用が阻害された。したがって、バーシカンのCS/DS鎖の硫酸化が、バーシカンと、L-セ렉チン及びP-セ렉チンのそれぞれとの相互作用に必要とされることが示唆された。一方、第1図のレーン13及び14に示すように、非硫酸化バーシカンは、カワシマ(Kawashima, H.)ら、[J. Biol. Chem., 275, 35448-35456, (2000)]のように、E-セ렉チン-Igとは相互作用しなかった。

対照的に、第1図のレーン17及び18に示されるように、バーシカンとCD44-Igとの間の相互作用は、塩素酸ナトリウム処理により阻害されなかった。しかしながら、バーシカンとCD44-Igとの間の相互作用が、塩素酸ナトリウム処理により阻害されなかったことは、バーシカンとヒアルロン酸とCD44-Igとからなる3分子複合体の形成によるものであることも考えられた。

そこで、ACHN細胞の $[^{35}\text{S}]$ メチオニン標識馴化培地を、文献[カワシマ(Kawashima, H.)ら、J. Biol. Chem., 275, 35448-35456, (2000); その全ての教示が参照により本明細書に取り込まれる]の記載と同様に、ヒアルロニダーゼSD(第1図中、「HA'ase」; 50mU/ml)で3時間処理し、ついで、得られた馴化培地と、CD44-Igとをインキュベートした。

その結果、前記ヒアルロン酸は、前記ヒアルロニダーゼSDによる処理により、ほぼ完全に分解・除去されたが、第1図のレーン19及び20に示されるように、バーシカンとCD44-Igとの相互作用は、全く影響されなかった。したがって、バーシカンの硫酸化が、バーシカンとCD44との相互作用に必要とさ

れないこと、すなわち、バーシカンのCS/DS鎖が、硫酸化非依存性様式でCD44と相互作用することが確認された。

## 実施例 2

種々のCS/DS鎖を用いて阻害アッセイを行ない、それにより、セ렉チン及びCD44のそれぞれと相互作用する構造を検討した。

### (1) CS/DS鎖の二糖組成解析

阻害アッセイに用いたCS/DS鎖は、コンドロイチン（表1中、「CH」）、コンドロイチン硫酸A（表1中、「CS A」）、コンドロイチンポリ硫酸（表1中、「CPS」）、デルマタン、雄鶏の鶏冠から精製されたデルマタン硫酸（表1中、「DS」；生化学工業株式会社製；ナガサワ(Nagasawa, K.)ら, Carbohydr. Res., 131, 301-314, (1984)）、デルマタンポリ硫酸（表1中、「DPS」）、コンドロイチン硫酸E（表1中、「CS E」）である。前記コンドロイチンは、クジラ軟骨由来コンドロイチン硫酸Aの化学的脱硫ナガサワ(Nagasawa, K.), J. Biochem., 86, 1323-1329 (1979)により生産されたものである。前記コンドロイチンポリ硫酸（生化学工業株式会社製）は、コンドロイチン硫酸Aの選択的6-O-硫酸化[ナガサワ(Nagasawa, K.)ら, Carbohydr. Res., 158, 183-190 (1986)]により生産されたものである。前記デルマタンポリ硫酸（生化学工業株式会社製）は、デルマタン硫酸の選択的6-O-硫酸化[ナガサワ(Nagasawa, K.)ら, Carbohydr. Res., 158, 183-190 (1986)]により生産されたものである。デルマタン（生化学工業株式会社製）は、前記デルマタン硫酸の化学的脱硫[ナガサワ(Nagasawa, K.), J. Biochem., 86, 1323-1329 (1979)]により生産されたものである。

フジモト(Fujimoto, T.)ら[Int. Immunol., 13, 359-366 (2001)；その全ての教示は、参照により本明細書に取り込まれる]のように、前記CS/DS鎖を



、コンドロイチナーゼABC（1単位/ml）により37℃で7時間処理した。得られた産物を、アミン結合シリカPA-03カラムでのHPLCに供し、それにより、二糖組成を決定した。結果を表1に示す。

表1

	$\Delta$ Di-0S	$\Delta$ Di-6S	$\Delta$ Di-4S	$\Delta$ Di-di(2,6)S	$\Delta$ Di-di(2,4)S	$\Delta$ Di-di(4,6)S	$\Delta$ Di-tri(2,4,6)S
CH	94.7	2.0	3.3				
CS A	2.2	23.7	74.1				
CPS		26.9	3.3	10.9		47.3	11.5
デルマタン	85.8		14.2				
DS	5.0	3.4	85.2		6.3		
DPS	1.8	9.1	1.5	2.9		62.1	21.2
CS E	5.8	9.7	18.7			65.9	

コンドロイチンポリ硫酸、コンドロイチン硫酸A及びコンドロイチンのそれぞれの鎖長及び原子価は、同一であるが、これらのグリコサミノグリカンの硫酸化の程度は異なる。同様に、デルマタンポリ硫酸、デルマタン硫酸及びデルマタンは、硫酸化のみが異なる。

## （2）結合阻害アッセイ

バーシカンと、L-セ렉チン、P-セ렉チン及びCD44のそれぞれとの結合の阻害アッセイを、以下のように行なった。まず、L-セ렉チン-Ig（ $3\mu\text{g/ml}$ ）、P-セ렉チン-Ig（ $4\mu\text{g/ml}$ ）又はCD44-Ig（ $0.25\mu\text{g/ml}$ ）を用いて、慣用の手法で、96ウェル平底マイクロタイタープレート（コスターEIA/RIAプレート ナンバー3690）上の各ウェルをコートした。ついで、得られたプレート上のウェルに、種々の濃度のケラタン硫酸、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸A、コンドロイチンポリ硫酸、デルマタン、デルマタン硫酸、デルマタンポリ硫酸及びコンドロイチン硫酸Eのそれぞれと、ビオチン化バーシカンとをウェルに添加し、プレートを、室温で2時

間インキュベートした。その後、前記緩衝液Aでプレートを洗浄し、カワシマ(Kawashima, H.)ら[J. Biol. Chem. 275, 35448-35456 (2000)]に記載のように、酵素結合免疫吸着定量法を行なった。アルカリホスファターゼ結合ストレプトアビジンとBlue Phos™基質とを用い、620nmにおける吸収を測定することにより、結合を測定した。

結果を第2図に示す。第2図中、十字は、ケラタン硫酸、白三角は、コンドロイチン、白四角は、コンドロイチン硫酸A、白丸は、コンドロイチンポリ硫酸、黒三角は、デルマタン、黒四角は、デルマタン硫酸、黒丸-実線は、デルマタンポリ硫酸、黒丸-点線は、コンドロイチン硫酸Eを示す。また、第2図中、パネルAは、バーシカンとL-セレクチンとの結合に関する結果である、パネルBは、バーシカンとP-セレクチンとの結合に関する結果である、パネルCは、バーシカンとCD44との結合に関する結果である。

第2図に示されるように、ビオチン化バーシカンと、L-セレクチン-Ig及びP-セレクチン-Igのそれぞれとの結合は、主要な二糖成分として、GlcA $\beta$ 1/IdoA $\alpha$ 1-3GalNAc(4, 6-O-ジスルフェート)を含むグリコサミノグリカン(コンドロイチンポリ硫酸、デルマタンポリ硫酸及びコンドロイチン硫酸E)により、用量依存的に阻害されるが、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸A、デルマタン、デルマタン硫酸等の低硫酸化若しくは非硫酸化CS/DS鎖又はケラタン硫酸により阻害されなかった。対照的に、ビオチン化バーシカンとCD44-Igとの結合は、低硫酸化CS/DS鎖、非硫酸化CS/DS鎖等の調べられた全CS/DS鎖により阻害されたが、ケラタン硫酸により阻害されなかった。

これらの結果は、硫酸化が、バーシカンのCS/DS鎖と、L-セレクチン及びP-セレクチンのそれぞれとの相互作用に重要な役割を果たすが、バーシカンのCS/DS鎖とCD44との相互作用には役割を果たさないという前記実施例1の結果と一致した。

### 実施例 3

バーシカンのグリコサミノグリカン構造をキャラクタライズした。

#### (1) バーシカン由来グリコサミノグリカンの調製

プロナーゼ〔90 U以上 カルビオケム (Calbiochem) 社製〕を含む溶液 (組成: 5 mM Tris-HCl, 5 mM CH<sub>3</sub>COONa, 1 mM CaCl<sub>2</sub>, 1 mM MgCl<sub>2</sub>, pH 8.0) 2 ml 中、精製バーシカン (80 μg) を 37°C で 48 時間インキュベートした。インキュベーション後、得られた産物に、0.5 ml の溶液 (組成: 1 M NaBH<sub>4</sub>、5 M NaOH) を添加し、37°C でインキュベートした。24 時間インキュベーション後、得られた産物に 0.5 ml の CH<sub>3</sub>COOH を添加することにより、反応を終了させ、バーシカン由来グリコサミノグリカンを含む反応混合物を得た。得られた反応混合物について、Spectra/Por 透析膜〔分子量排除限界 3,500 ; ザ スペクトラムコーポレーション (The Spectrum Co.) 社製〕を用いて、蒸留水に対して透析し、バーシカン由来グリコサミノグリカンを得た。

#### (2) バーシカン由来グリコサミノグリカンの高感度二糖組成解析

コンドロ-6-スルファターゼ〔0.31 U/ml 緩衝液 B (トリエチルアミンで pH 7.0 に調整された 3% 酢酸)〕の存在下又は非存在下、前記 (1) で得られたバーシカン由来グリコサミノグリカンと、コンドロイチナーゼ A B C (0.38 U/ml) とを、37°C で 1 時間インキュベートし、得られた産物を乾燥させ、二糖産物を得た。ついで、キノシタらの方法〔キノシタ (Kinoshita, A.) ら、Anal. Biochem., 269, 367-378 (1999)〕に従って、前記二糖産物 (0.1 ~ 50 nmol) と、誘導体化試薬混合物〔組成: ジメチルスルホキシド中

、0.35M 2-アミノベンゾアミド(2-AB)、1.0M NaCNBH<sub>4</sub>、30重量% 酢酸) 5  $\mu$ l とを混合し、得られた混合物を、65°Cで2時間インキュベートした。ついで、得られた産物を、クロロホルム：蒸留水(1：1)で分画し、誘導体化二糖を含む水層を回収した。

得られた誘導体化二糖を含む水層について、既報 [フジモト(Fujimoto, T.)ら、Int. Immunol. 13, 359-366 (2001)] のように、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により解析した。抽出物について、蛍光検出器を用いて330nmの励起波長及び420nmの発光波長のそれぞれをモニターした。結果を第3図に示す。なお、第3図中、0Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta$ Di-0Sの溶出位置、4Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta$ Di-4Sの溶出位置、6Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta$ Di-6Sの溶出位置、diS<sub>D</sub>は、2-AB-誘導体化 $\Delta$ Di-di(2, 6)Sの溶出位置、diS<sub>E</sub>は、2-AB-誘導体化 $\Delta$ Di-di(4, 6)Sの溶出位置、UA2Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta$ Di-UA2Sの溶出位置を示す。また、二糖標品の略称の対応表を表2に示す。

表 2

略称	糖鎖
$\Delta$ Di-0S	$\Delta^{4,5}\text{HexA}\alpha 1\text{-3GalNAc}$
$\Delta$ Di-4S	$\Delta^{4,5}\text{HexA}\alpha 1\text{-3GalNAc}(4\text{-O-スルフェート})$
$\Delta$ Di-6S	$\Delta^{4,5}\text{HexA}\alpha 1\text{-3GalNAc}(6\text{-O-スルフェート})$
$\Delta$ Di-di(2,6)S	$\Delta^{4,5}\text{HexA}(2\text{-O-スルフェート})\alpha 1\text{-3GalNAc}(6\text{-O-スルフェート})$
$\Delta$ Di-di(2,4)S	$\Delta^{4,5}\text{HexA}(2\text{-O-スルフェート})\alpha 1\text{-3GalNAc}(4\text{-スルフェート})$
$\Delta$ Di-di(4,6)S	$\Delta^{4,5}\text{HexA}\alpha 1\text{-3GalNAc}(4,6\text{-O-ジスルフェート})$
$\Delta$ Di-tri(2,4,6)S	$\Delta^{4,5}\text{HexA}(2\text{-O-スルフェート})\alpha 1\text{-3GalNAc}(4,6\text{-O-ジスルフェート})$
$\Delta$ Di-UA2S	$\Delta^{4,5}\text{HexA}(2\text{-O-スルフェート})\alpha 1\text{-3GalNAc}$
Di-0S	$\text{GlcA}\beta 1\text{-3 GalNAc}$
Di-4S	$\text{GlcA}\beta 1\text{-3GalNAc}(4\text{-O-スルフェート})$
Di-6S	$\text{GlcA}\beta 1\text{-3GalNAc}(6\text{-O-スルフェート})$
Di-di(4,6)S	$\text{GlcA}\beta 1\text{-3GalNAc}(4,6\text{-O-ジスルフェート})$

第3図のパネルAに示されるように、コンドロイチナーゼABCにより処理されたパーシカン由来グリコサミノグリカンについては、二糖標品の溶出位置に対応する5つのピークが検出された。また、第3図のパネルBに示されるように、コンドロ-6-スルファターゼとコンドロイチナーゼABCとにより処理されたパーシカン由来グリコサミノグリカンについては、 $\Delta$ Di-0S、 $\Delta$ Di-UA-2S及び $\Delta$ Di-4Sに対応する3つのピークが検出され、第3図のパネルAにおいて検出された5つのピークが、 $\Delta$ Di-0S、 $\Delta$ Di-6S、 $\Delta$ Di-4S、 $\Delta$ Di-di(2,6)S及び $\Delta$ Di-di(4,6)Sであることが確認された。

第3図のパネルAにおける $\Delta$ Di-0S、 $\Delta$ Di-6S、 $\Delta$ Di-4S、 $\Delta$ Di-di(2,6)S及び $\Delta$ Di-di(4,6)Sのそれぞれのピーク面積は、0.8%、15.7%、77.6%、1.4%及び4.5%であった。二糖標

品に対応しない小さい付加的なピーク（6.3%）が検出されたが、コンドロイチナーゼABCの代わりにコンドロイチナーゼACIIを用いて、同様の結果が得られた。これらの結果により、バーシカンのグリコサミノグリカンが、 $G1cA\beta1-3GalNAc(4,6-O\text{-}シスルフェート)$ を含み、主要なCS鎖と、コンドロイチナーゼACIIに耐性であるマイナーなDS鎖との混合物から構成されたヘテロポリマーであることが示唆された。

#### 実施例 4

バーシカンは、接着分子だけでなく、特定のケモカインとも相互作用しうることが示されている【ヒロセ(Hirose, J.)ら、J. Biol. Chem., 276, 5228-5234 (2001)】。そこで、バーシカンとケモカインとの相互作用に対する硫酸化の必要性を検討した。

##### (1) 低硫酸化バーシカンの調製

10重量% ウシ胎仔血清を含むRPMI 1640中100mM 塩素酸ナトリウムの存在下又は非存在下にACHN細胞を2日間培養した。馴化培地を取り出した後、無血清培地であるEX-CELL 610 HSF〔ジェイアールエイチ バイオサイエンス(JRH Bioscience)社製〕中、100mM 塩素酸ナトリウムの存在下又は非存在下に、細胞をさらに4日間培養した。馴化培地を回収し、 $10,000\times g$ で15分間4℃でスピンして、塩素酸ナトリウム処理馴化培地及び塩素酸ナトリウム非処理馴化培地のそれぞれを得た。

塩素酸ナトリウム処理馴化培地又は塩素酸ナトリウム非処理馴化培地と、20濁度減少単位/ml ヒアルロニダーゼ(*Streptomyces hyalurolyticus*)とを、37℃で4.5時間インキュベートした。その後、得られた産物のそれぞれと、抗D抗体(10 $\mu$ g)結合プロテインA-セファロースビーズ(10 $\mu$ lビーズ)とをインキュベートして、各馴化培地からバー

シカンを生じた。得られたビーズを洗浄し、該ビーズを、1単位/ml コンドロイチナーゼABCと1単位/ml コンドロイチナーゼACIIとの存在下、37℃で2時間をインキュベートした。その後、二糖産物を回収し、前記キノシタらの方法に従って、2-ABで、二糖産物を誘導体化した。得られた誘導体化二糖産物をHPLCで解析した。その結果を第4図のパネルAに示す。なお、第4図のパネルA中、0Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-0S$ の溶出位置、4Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-4S$ の溶出位置、6Sは、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-6S$ の溶出位置、 $diS_d$ は、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-di(2, 6)S$ の溶出位置、 $diS_s$ は、2-AB-誘導体化 $\Delta Di-di(4, 6)S$ の溶出位置を示す。

第4図のパネルAに示されるように、塩素酸ナトリウム処理した馴化培地から得られたバーシカン由来グリコサミノグリカンの場合、 $\Delta Di-0S$ のみがバーシカン由来グリコサミノグリカンにおける主要ピーク(82.8%)として検出され、 $\Delta Di-6S$ (7.2%)及び $\Delta Di-4S$ (10.0%)は、マイナーピークとして検出され、 $\Delta Di-di(2, 6)S$ 又は $\Delta Di-di(4, 6)$ は検出されなかった。したがって、塩素酸ナトリウム処理により、主に非硫酸化CS/DS鎖を生じる低硫酸化バーシカンを生じることがわかる。

## (2) サンドウィッチ型酵素結合免疫吸着定量法

得られた低硫酸化バーシカン及びインタクトなバーシカンのそれぞれと、ケモカインとの結合を、サンドウィッチ型酵素結合免疫吸着定量法で調べた。

BSA(6  $\mu g/ml$ )、抗バーシカンモノクローナル抗体2B1(第4図中、「2B1」; 5  $\mu g/ml$ )、L-セレクトイン-Ig(第4図中、「L-Ig」; 3  $\mu g/ml$ )、E-セレクトイン-Ig(第4図中、「E-Ig」; 3  $\mu g/ml$ )、P-セレクトイン-Ig(第4図中、「P-Ig」; 3  $\mu g/ml$ )、CD44-Ig(3  $\mu g/ml$ )、二次リンパ様組織ケモカイン(第4図中、「

SLC」； $3\mu\text{g}/\text{ml}$ ）、C末端切形型二次リンパ様組織ケモカイン（第4図中、「SLC-T」； $3\mu\text{g}/\text{ml}$ ）、 $\gamma$ -インターフェロン誘導性タンパク質-10（第4図中、「IP-10」； $3\mu\text{g}/\text{ml}$ ）、血小板因子4（第4図中、「PF4」； $6\mu\text{g}/\text{ml}$ ）、間質細胞由来因子-1 $\beta$ （第4図中、「SDF-1 $\beta$ 」； $6\mu\text{g}/\text{ml}$ ）又は間質細胞由来因子-1 $\alpha$ （第4図中、「SDF-1 $\alpha$ 」； $6\mu\text{g}/\text{ml}$ ）で、96ウェル平底マイクロタイタープレートのウェルをコートし、ついで、3重量% BSAを含むリン酸緩衝化生理的食塩水で、該ウェルをブロックした。なお、前記C末端切形型二次リンパ様組織ケモカインとして、メリッサ スウォープ-ウィリス博士〔ベルテックス ファーマシューティカル コーポレーション（Vertex Pharmaceutical Co.）〕により提供されたものを用いた。

得られたプレート上のウェルに、塩素酸ナトリウム処理ACHN細胞の馴化培地又は塩素酸ナトリウム非処理ACHN細胞の馴化培地を添加し、1時間インキュベートした。前記緩衝液Aでウェルを洗浄した後、 $1\mu\text{g}/\text{ml}$  ビオチン化抗D抗体を添加し、1時間インキュベートした。アルカリホスファターゼ結合ストレプトアビジンとBlue Phos<sup>TM</sup>基質とを用い、620nmにおける吸収を測定することにより、結合を測定した。結果を第4図のパネルBに示す。なお、第4図のパネルB中、黒バーは、非処理馴化培地由来バーシカンを用いた場合の結果を示し、斜線バーは、塩素酸ナトリウム処理馴化培地由来バーシカンを用いた場合の結果を示す。各バーは、4連の測定の平均±標準偏差を示す。

第4図のパネルBに示されるように、インタクトなバーシカンと低硫酸化バーシカンとの両方が、抗バーシカンモノクローナル抗体2B1及びCD44-Igに結合し、インタクトなバーシカンのみが、L-セレクチン-Ig及びP-セレクチン-Igと結合し、第1図に示される結果と一致した。

また、第4図のパネルBに示されるように、インタクトであるが低硫酸化でないバーシカン（黒バー）は、顕著に、二次リンパ様組織ケモカイン、 $\gamma$ -インタ



ーフェロン誘導タンパク質-10、血小板因子4、間質細胞由来因子-1 $\beta$ 等のケモカインと結合した。したがって、バーシカンのCS/DS鎖における硫酸化が、ケモカインと相互作用するのに必要であることが示唆された。

さらに、第4図のパネルBに示されるように、インタクト及び低硫酸化のいずれの型のバーシカンも、塩基性アミノ酸クラスターを含むC末端32アミノ酸を欠損した組換え切形型二次リンパ様組織ケモカインとほとんど結合せず、あったとしてもごくわずかしき結合しなかった。また、インタクト及び低硫酸化のいずれの型のバーシカンも、間質細胞由来因子-1 $\beta$ のC末端4アミノ酸を天然に欠損した間質細胞由来因子-1 $\alpha$ に結合しなかった。これらの結果により、バーシカンのCS/DS鎖が、二次リンパ様組織ケモカインのC末端領域及び間質細胞由来因子-1 $\beta$ のC末端領域のそれぞれと相互作用することが示唆された。

#### 実施例5

バーシカンとケモカインとの結合における過硫酸化CS/DS鎖の影響を調べた。

BSA (5  $\mu$ g/ml)、抗バーシカンモノクローナル抗体2B1 (5  $\mu$ g/ml)、CD44-Ig (7  $\mu$ g/ml)、L-セレクトリン-Ig (3  $\mu$ g/ml)、P-セレクトリン-Ig (3  $\mu$ g/ml)又はケモカイン (1  $\mu$ g/ml)で96ウェル平底マイクロタイタープレートのウェルをコートし、ついで、3重量% BSAを含むリン酸緩衝化生理的食塩水でブロックした。なお、前記ケモカインとして、二次リンパ様組織ケモカイン、 $\gamma$ -インターフェロン誘導性タンパク質-10、血小板因子4、間質細胞由来因子-1 $\beta$ 〔ペプロ テック (P e p r o T e c h) 社製〕及び間質細胞由来因子-1 $\alpha$ 〔ペプロ テック (P e p r o T e c h) 社製〕を用いた。

得られたプレート上のウェル中、ビオチン化バーシカン (0.25  $\mu$ g/ml)を、100  $\mu$ g/mlの各グリコサミノグリカン (コンドロイチン、コンドロ

イチン硫酸A、コンドロイチンポリ硫酸、デルマタンポリ硫酸及びコンドロイチン硫酸E)の存在下又は非存在下に、室温で2時間インキュベートした。その後、前記緩衝液Aでプレートを洗浄し、既報 [カワシマ(Kawashima, H.) ら、J. Biol. Chem., 275, 35448-35456 (2000)] のように、酵素結合免疫吸着定量法を行った。アルカリホスファターゼ結合ストレプトアビジンとBlue Phos<sup>TM</sup>基質とを用い、620nmにおける吸収を測定することにより、結合を測定した。結果を第5図に示す。なお、第5図中、横軸の表記は、第4図と同様である。また、各レーン中、バー1は、グリコサミノグリカン非存在下における結果、バー2は、コンドロイチン、バー3は、コンドロイチン硫酸A、バー4は、コンドロイチンポリ硫酸、バー5は、デルマタンポリ硫酸、バー6は、コンドロイチン硫酸Eを示す。

第5図に示されるように、ビオチン化バーシカンと、二次リンパ様組織ケモカイン、 $\gamma$ -インターフェロン誘導性タンパク質-10、血小板因子4、間質細胞由来因子-1 $\beta$ 、L-セレクトリン及びP-セレクトリンのそれぞれとの結合のそれぞれは、コンドロイチンポリ硫酸、デルマタンポリ硫酸、コンドロイチン硫酸E等の過硫酸化CS/D S鎖により同程度まで阻害された。また、前記に示したように、ビオチン化バーシカンとCD44-Igとの結合は、コンドロイチン、コンドロイチン硫酸A、デルマタンポリ硫酸及びコンドロイチン硫酸Eのそれぞれにより阻害されたが、コンドロイチンポリ硫酸の影響は、本実験の系で用いられた用量範囲において顕著でなかった。バーシカンと抗バーシカンモノクローナル抗体2B1との結合は、調べられたグリコサミノグリカンのいずれかの添加によっても、影響をうけなかった。すなわち、これらの結果により、CS/D S鎖の硫酸化が、ケモカインとの相互作用に必要とされ、GlcA $\beta$ 1/I d o A $\alpha$ 1-3GalNAc(4, 6-O-ジスルフェート)を含む過硫酸化CS/D S鎖が、ケモカインと相互作用することが示唆された。

## 実施例 6

BIAcore™バイオセンサー〔ビアコア エービー (BIAcore AB) 社製〕を用いた表面プラズモン共鳴により、種々のCS/DS鎖と、L-セレクチン、P-セレクチン、CD44及びケモカインのそれぞれとの相互作用の親和性速度論を調べた。

全実験を25℃で行なった。洗浄及び解離段階において、ランニングバッファーとして、緩衝液C (20 mM HEPES-NaOH, 0.15 M NaCl, 1 mM CaCl<sub>2</sub>, 1 mM MgCl<sub>2</sub>, pH 6.8) を用いた。

まず、アミンカップリングキット〔アマシャム-バイオサイエンス (Amersham-Bioscience) 社製〕を用い、製造者により提供された説明書に従って、一級アミン基を介して、約1.8-2.0キロレゾナンス単位 (1 キロレゾナンス単位 = 1 ng/mm<sup>2</sup>) のストレプトアビジンをB1センサーチップに共有結合的に固定化した。残りの活性化基を、150 μl の1 M エタノールアミン-HCl (pH 8.5) でブロックした。ついで、サディール (Sadir) らの方法 [J. Biol. Chem., 276, 8288-8296 (2001) ; その全ての教示は、参照により本明細書に取り込まれる] に従って、EZ-link™ ビオチン-L-C-ヒドラジド〔ピアス (Pierce) 社製〕を用い、還元末端でビオチン化した各グリコサミノグリカン、を、約150レゾナンス単位の固定化レベルを得るように、センサーチップ表面にインジェクトした。

種々の濃度の二次リンパ様組織ケモカイン、γ-インターフェロン誘導性タンパク質-10、間質細胞由来因子-1β、単量体L-セレクチン〔ジェンザイム-テック (Genzyme-Techne) 社製〕、単量体P-セレクチン〔ジェンザイム-テック (Genzyme-Techne) 社製〕及び単量体CD44を、グリコサミノグリカン結合センサーチップに流速30 μl/分で0~90秒間、連続的にインジェクトし、ついで、ランニングバッファーをインジェクトすることにより、結合アッセイを行なった。レゾナンス単位での応答を時間の関

数として記録した。

なお、センサーチップ表面について、ケモカイン又はCD44を用いた場合、 $300\mu\text{l}$ の $1\text{M}$  NaClで再生し、セレクトインを用いた場合、 $300\mu\text{l}$ の $1\text{M}$  NaClと、つづく $100\mu\text{l}$ の $50\text{mM}$  EDTA (pH8.0)とで再生した。センサーチップ表面を再生した結果、ベースラインにおける顕著な変化は、観察されなかった。

単一部位結合モデルを用いたBIAevaluation 3.0 software〔ファルマシアバイオセンサー (Pharmacia Biosensor) 社製〕により、親和性速度論的パラメーターを決定した。第6図に、固定化グリコサミノグリカンと、ケモカイン、L-セレクトイン及びCD44それぞれとの相互作用を記録したBIAcoreのセンサーグラムを示し、該相互作用の速度論的パラメータ〔会合速度定数 ( $k_{on}$ )、解離速度定数 ( $k_{off}$ ) 及び平衡解離定数 ( $K_d$ )〕を、表3に示す。なお、第6図及び表3中、SLCは、二次リンパ様組織ケモカインを、IP-10は、 $\gamma$ -インターフェロン誘導性タンパク質-10を、SDF-1 $\beta$ は、間質細胞由来因子-1 $\beta$ を示し、CS Eは、コンドロイチン硫酸Eを、CS Aは、コンドロイチン硫酸Aを示す。また、表3中、単量体CD44とコンドロイチン硫酸Eとの間の相互作用の $K_d$ 値は、平衡時の結合量から算出された値であり、CD44とヒアルロン酸との間の相互作用の $K_d$ 値は、CD44-Igを用いて算出された値である。

表 3

タンパク質	GAG	$k_{on}$ ( $M^{-1}s^{-1}$ )	$k_{off}$ ( $s^{-1}$ )	$K_d$ (nM)
L-セ렉チン	CS E	$2.07 \times 10^4$	$4.39 \times 10^{-4}$	21.2
	CPS	$7.68 \times 10^3$	$3.66 \times 10^{-4}$	47.7
	DPS	$1.37 \times 10^4$	$2.89 \times 10^{-4}$	21.1
P-セ렉チン	CS E	$4.21 \times 10^4$	$1.25 \times 10^{-3}$	29.7
	CPS	$1.34 \times 10^4$	$7.59 \times 10^{-4}$	56.8
	DPS	$2.40 \times 10^4$	$6.64 \times 10^{-4}$	27.7
CD44	CS E <sup>a</sup>	ND <sup>b</sup>	ND	$2.11 \times 10^5$
	CH	$5.03 \times 10^2$	$6.49 \times 10^{-2}$	$1.29 \times 10^5$
	CS A	$5.76 \times 10^2$	$4.90 \times 10^{-2}$	$8.52 \times 10^4$
	HA <sup>c</sup>	$2.61 \times 10^4$	$5.43 \times 10^{-2}$	$2.08 \times 10^3$
SLC	CS E	$4.15 \times 10^4$	$3.56 \times 10^{-3}$	85.8
	CPS	$2.42 \times 10^4$	$2.44 \times 10^{-3}$	101
	DPS	$8.64 \times 10^3$	$2.78 \times 10^{-4}$	32.2
IP-10	CS E	$1.62 \times 10^4$	$2.11 \times 10^{-3}$	130
	CPS	$3.15 \times 10^4$	$2.30 \times 10^{-3}$	73.2
	DPS	$2.64 \times 10^4$	$9.23 \times 10^{-4}$	34.9
SDF-1 $\beta$	CS E	$1.81 \times 10^4$	$5.30 \times 10^{-3}$	293
	CPS	$3.52 \times 10^4$	$3.04 \times 10^{-3}$	86.3

- a 単量体 CD44 と CS E との間の相互作用の  $K_d$  値は、平衡時の結合量から算出された。
- b ND、決定できず。
- c CD44 と HA との間の相互作用の  $K_d$  値は、CD44-Ig を用いて測定された。親和性速度論的パラメータは、二価分析物結合モデルを用いて、BIAevaluation3.0 ソフトウェアにより決定された。

第 6 図に示されるように、二次リンパ様組織ケモカイン、 $\gamma$ -インターフェロン誘導性タンパク質-10、間質細胞由来因子-1 $\beta$ 、単量体 L-セ렉チン及び単量体 P-セ렉チンは、センサーチップ表面に固定化されたコンドロイチン硫酸 E に、用量依存的に結合した。同様の親和性速度論が、コンドロイチン硫酸 E の代わりに、コンドロイチンポリ硫酸又はデルマタンポリ硫酸を用いた場合に

観察された。対照的に、セレクチン及びケモカインは、コンドロイチン硫酸A又はコンドロイチンと相互作用しなかった。これらの結果は、第2図及び第5図に示される前記阻害アッセイの結果と一致した。

さらに、表3に示された親和性速度論的パラメータの評価により、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインが、 $\text{GlcA}\beta 1/\text{IdoA}\alpha 1-3\text{GalNAc}(4,6\text{-O-ジスルフェート})$ を含む過硫酸化CS/DS鎖と高い親和性( $K_d 21.1\sim 293\text{ nM}$ )で相互作用することが示された。対照的に、CD44とグリコサミノグリカンとの相互作用は、セレクチンとグリコサミノグリカンとの相互作用及びケモカインとグリコサミノグリカンとの相互作用とはかなり異なることが示された。また、表3の結果より、単量体CD44が、低い親和性( $K_d 85.2\sim 129\text{ }\mu\text{M}$ )でコンドロイチン硫酸A又はコンドロイチンと結合することが示された。単量体CD44は、コンドロイチン硫酸Eに弱く( $K_d 211\text{ }\mu\text{M}$ )結合し、コンドロイチンポリ硫酸又はデルマタンポリ硫酸には結合しなかった。調べられたCS/DS鎖は、いずれも、単量体E-セレクチン、C末端切形型二次リンパ様組織ケモカイン及び間質細胞由来因子-1 $\alpha$ と、ほとんど相互作用せず、あったとしてもごくわずかしかな相互作用しなかった。一方、表3に示されるように、過硫酸化CS/DS鎖は、L-セレクチン又はP-セレクチンの場合と同様に、高い親和性で特定のケモカインと相互作用した。過硫酸化CS/DS鎖とケモカイン(二次リンパ様組織ケモカイン、 $\gamma$ -インターフェロン誘導タンパク質-10、間質細胞由来因子-1 $\beta$ )との高親和性結合により、これらのケモカインが、イン・ビボで過硫酸化CS/DS鎖により、直ちにトラップされるであろうことが示唆される。この仮定は、過硫酸化CS/DS-ケモカイン複合体形成が、速い会合速度( $0.864\sim 4.15\times 10^4\text{ M}^{-1}\text{ s}^{-1}$ )により特徴付けられることを示した表面プラズモン共鳴解析による速度論解析により支持される。

従来、単量体L-セレクチンは、低い親和性( $K_d = 108\text{ }\mu\text{M}$ )で、非常に

速い会合速度 ( $\geq 10^6 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ) 及び解離速度 ( $\geq 10^6 \text{ s}^{-1}$ ) で、固定化されたグリコシル化依存性細胞接着分子-1 (GlyCAM-1) と結合することが報告されている [ニコルソン(Nicholson, M. W.)ら、J. Biol. Chem., 273, 763-770 (1998)]。また、単量体P-セ렉チンは、相対的に高い親和性 ( $K_d \sim 300 \text{ nM}$ ) で、速い会合速度 ( $4.4 \times 10^6 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ) 及び解離速度 ( $1.4 \text{ s}^{-1}$ ) で、P-セ렉チン糖タンパク質リガンド-1 と結合することが報告されている [メータ(Mehta, P.)ら、J. Biol. Chem., 273, 32506-32513 (1998)]。これらの性質は、速い接着と脱接着とにより媒介されるセ렉チン媒介ローリング接着動態に重要であると推定されている。

しかしながら、驚くべきことに、第6図及び表3に示されるように、表面プラズモン共鳴解析により、過硫酸化CS/DS鎖と、L-セ렉チン及びP-セ렉チンのそれぞれとの結合親和性は、既知リガンドと、L-セ렉チン及びP-セ렉チンのそれぞれとの結合親和性よりも高いことが示された。したがって、適切なCS/DS鎖が局所的に発現される場合、表3に示されるような遅い解離速度での、過硫酸化CS/DS鎖と、L-セ렉チン及びP-セ렉チンのそれぞれとの高親和性結合が、異なるローリング速度での白血球のローリング相互作用及び/又は静的接着相互作用を可能にすると考えられる。

## 実施例7

ヒツジ精巢ヒアルロニダーゼによる消化により、コンドロイチン硫酸A、コンドロイチン硫酸C及びコンドロイチン硫酸Eのそれぞれから各種オリゴ糖断片を調製し、L-セ렉チン、P-セ렉チン、CD44及びケモカインのそれぞれと直接的に相互作用する構造単位を調べた。

(1) コンドロイチン硫酸A、コンドロイチン硫酸C及びコンドロイチン硫酸Eのいずれか由来のストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼ結合ビオチ

### ン化オリゴ糖断片の調製

イカ軟骨由来コンドロイチン硫酸E (1 mg) を、0.6 mg ヒツジ精巢ヒアルロニダーゼ〔1,800単位;シグマ(Sigma)社製〕を含む溶液(組成:50 mM 酢酸ナトリウム、133 mM NaCl及び0.04%ゼラチン, pH 5.0)に懸濁した。得られた反応液を、37°Cで全68.5時間インキュベートして、コンドロイチン硫酸E由来オリゴ糖断片を含む消化産物を得た。なお、インキュベーション開始から、24時間経過時及び45.5時間経過時に、追加の2 mg (6,000単位)の酵素を反応液に添加した。

また、クジラ軟骨由来コンドロイチン硫酸A及びサメ軟骨由来コンドロイチン硫酸Cのそれぞれを、0.6 mg ヒツジ精巢ヒアルロニダーゼ〔1,800単位;シグマ(Sigma)社製〕を含む溶液(組成:50 mM 酢酸ナトリウム, pH 5.0)に懸濁した。得られた各反応液を、37°Cで24時間インキュベートし、コンドロイチン硫酸A由来オリゴ糖断片を含む消化産物及びコンドロイチン硫酸C由来オリゴ糖断片を含む消化産物のそれぞれを得た。

得られた消化産物のそれぞれを、16 mM~1 M  $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  のリニアグラジェントによるアミン結合シリカPA-03カラムを用いたHPLCにより分画した。得られた各画分を、蒸留水で平衡化したセファデックスG-25カラム〔1×30 cm;アマシャム-バイオサイエンス(Amersham-Bioscience)社製〕に供した。210 nmにおける吸収により、溶出をモニターした。その結果、第7図のパネルAに示される画分aと画分cと画分e-1と画分e-2とが得られた。

### (2) オリゴ糖断片の炭化水素構造の解析

画分a、画分c、画分e-1及び画分e-2のそれぞれを、コンドロイチナーゼACII (0.3単位/ml)で37°C1時間消化し、得られた消化産物を2-ABで誘導体化した。ついで、得られた各産物について、16~606 mM



$\text{NaH}_2\text{PO}_4$  45分間のリニアグラジェント溶出によるアミン結合シリカP  
A-03カラムを用いたHPLCで解析した。

第7図のパネルBに示すように、コンドロイチナーゼACIIで処理した画分  
e-1について、Di-di(4, 6)Sと $\Delta$ Di-4Sとが、約1:1のモル  
比で検出された。これらのピークは、コンドロイチナーゼACIIとコンドロ  
6-スルファターゼとの混合物による処理後、それぞれ、Di-4S及び $\Delta$ Di  
-4S位置にシフトし、コンドロイチナーゼACIIとコンドロ6-スルファ  
ターゼとコンドロ4-スルファターゼとの混合物による処理後、さらに、それ  
ぞれ、Di-0S及び $\Delta$ Di-0S位置にシフトした。したがって、これらの結  
果により、画分e-1が、 $\text{GlcA}\beta 1-3\text{GalNAc}(4, 6\text{-O-ジスル}$   
 $\text{フェート})\beta 1-4\text{GlcA}\beta 1-3\text{GalNAc}(4\text{-O-スルフェート})$ の  
構造に相当することが示唆され、かかる構造は、マスペクトルからも支持され  
た。

同様に、画分aの構造は、 $\text{GlcA}\beta 1-3\text{GalNAc}(4\text{-O-スルフェ$   
 $\text{ート})\beta 1-4\text{GlcA}\beta 1-3\text{GalNAc}(4\text{-O-スルフェート})$ に相当  
し、画分cの構造は、 $\text{GlcA}\beta 1-3\text{GalNAc}(6\text{-O-スルフェート})$   
 $\beta 1-4\text{GlcA}\beta 1-3\text{GalNAc}(6\text{-O-スルフェート})$ に相当し、画  
分e-2の構造は、 $\text{GlcA}\beta 1-3\text{GalNAc}(4, 6\text{-O-ジスルフェ$   
 $\text{ート})\beta 1-4\text{GlcA}\beta 1-3\text{GalNAc}(4, 6\text{-O-ジスルフェート})$ に  
相当することが決定された。

以上の結果を、第7図のパネルCに、オリゴ糖の構造の模式図として示す。第  
7図のパネルC中、黒三角は、GlcA、斜線丸は、GalNAc、4Sは、4  
-O-硫酸化、6Sは、6-O-硫酸化、 $\beta 3$ は、 $\beta 1-3$ 結合、 $\beta 4$ は、 $\beta 1$   
-4結合を表わす。

(3) オリゴ糖断片と、L-セレクチン、P-セレクチン、CD44及びケモカ

## インのそれぞれとの相互作用の解析

画分 a、画分 c、画分 e-1 及び画分 e-2 のそれぞれに含まれるオリゴ糖と、L-セレクトリン、P-セレクトリン、CD44 及びケモカインのそれぞれとの相互作用を調べた。

まず、ビオチン-LC-ヒドラジドにより、各オリゴ糖を還元末端においてビオチン化した。前記(2)で得られた画分 a、画分 c、画分 e-1 及び画分 e-2 のそれぞれに、125mM EZ-link™ ビオチン-LC-ヒドラジドとジメチルスルホキシド/酢酸(7:3)中 1M NaCNBH<sub>3</sub> とを添加した。得られた反応混合物を、3時間 65℃でインキュベートし、ついで、37℃で 12.5~18.5 時間インキュベートすることにより、オリゴ糖をビオチン化した。得られた各反応産物を、前記のようにセファデックス G-25 カラムに供して、未反応のビオチン-LC-ヒドラジドを除去し、ビオチン化オリゴ糖を含む画分を回収した。ついで、得られた画分を、蒸発乾固した。

得られたビオチン化オリゴ糖画分の一部を、コンドロイチナーゼ ACII で消化し、ついで、得られた消化産物を 2-AB 誘導体化した。得られた産物を、HPLC により解析した結果、還元末端由来不飽和二糖でなく、非還元末端由来二糖が検出された。したがって、約 100% のオリゴ糖がビオチン化されたことが明らかとなった。

ついで、16pmol の各ビオチン化オリゴ糖を含む画分の一部を、前記緩衝液 A 0.5ml に溶解し、得られた各溶液と 1μl (2pmol) のストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼ〔プロメガ (Promega) 社製〕とを、4℃で一晩インキュベートした。

得られた各産物を緩衝液 A で 3 倍に希釈し、得られた各溶液を、BSA (10μg/ml)、L-セレクトリン-Ig (5μg/ml)、E-セレクトリン-Ig (5μg/ml)、P-セレクトリン-Ig (5μg/ml)、CD44-Ig (5μg/ml)、二次リンパ様組織ケモカイン (5μg/ml)、C 末端切形型

二次リンパ様組織ケモカイン ( $5 \mu\text{g}/\text{ml}$ )、 $\gamma$ -インターフェロン誘導性タンパク質-10 ( $10 \mu\text{g}/\text{ml}$ )、血小板因子4 ( $2.5 \mu\text{g}/\text{ml}$ )、間質細胞由来因子-1 $\beta$  ( $5 \mu\text{g}/\text{ml}$ )又は間質細胞由来因子-1 $\alpha$  ( $5 \mu\text{g}/\text{ml}$ )でコートされた96ウェル平底マイクロタイタープレート(コスターEIA/RIAプレートナンバー3690)のウェルに供した。Blue Phos<sup>TM</sup>基質を用い、620nmにおける吸収を測定することにより、結合を測定した。結果を第7図のパネルDに示す。なお、第7図のパネルD中、横軸の表記は、前記第4図と同様である。また、各レーン中、バー1は、ストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼを用いた場合の結果、バー2は、ビオチン化画分a結合ストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼを用いた場合の結果、バー3は、ビオチン化画分c結合ストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼを用いた場合の結果、バー4は、ビオチン化画分e-1結合ストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼを用いた場合の結果、バー5は、ビオチン化画分e-2結合ストレプトアビジン結合アルカリホスファターゼを用いた場合の結果を示す。

第7図のパネルDに示すように、興味深いことに、e-2画分のみがL-セレクチン-Ig、P-セレクチン-Ig、二次リンパ様組織ケモカイン、 $\gamma$ -インターフェロン誘導性タンパク質-10及び間質細胞由来因子-1 $\beta$ と結合したが、他は結合しなかった。e-1画分は、血小板因子4と穏やかに結合したが、他のケモカイン又はL-及びP-セレクチンとは結合しなかった。これらの結果により、繰返しG1cA $\beta$ 1-3GalNAc(4,6-O-ジスルフェート)単位は、L-セレクチン、P-セレクチン及び調べられた多数のケモカインにより特異的に認識され、単独のG1cA $\beta$ 1-3GalNAc(4,6-O-ジスルフェート)は、恐らく血小板因子4との相互作用に十分であろうことが示された。

第7図に示されるように、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれが、繰返しG1cA $\beta$ 1-3GalNAc(4,6-O-ジスルフェート)単位は、L-セレクチン、P-セレクチン及び調べられた多数のケモカインにより特異的に認識され、単独のG1cA $\beta$ 1-3GalNAc(4,6-O-ジスルフェート)は、恐らく血小板因子4との相互作用に十分であろうことが示された。

ート) 単位から構成された四糖と優先的に結合し、また、前記表 3 に示されるように、CD 44 が、非硫酸化コンドロイチン硫酸鎖又は低硫酸化コンドロイチン硫酸鎖と優先的に相互作用するため、GlcA $\beta$ 1-3GalNAc(4, 6-O-スルフェート) 単位がグリコサミノグリカン中にクラスターとして存在する場合、恐らく、これらの単位が、L-セレクトリン、P-セレクトリン及びケモカインのそれぞれと相互作用すると思われる。また、GlcA $\beta$ 1-3GalNAc(4-O-スルフェート) 又は GlcA $\beta$ 1-3GalNAc(6-O-スルフェート) を含む異なる構造が、CD 44 と相互作用すると思われる。

#### 実施例 8

過硫酸化 CS/DS 鎖がケモカイン活性をも阻害するかどうかを調べた。L1.2/CCR7 細胞 ( $1 \times 10^6$  細胞/ml) を、Fura-2 で負荷し、グリコサミノグリカン ( $100 \mu\text{g/ml}$ ) の存在下又は非存在下に、二次リンパ様組織ケモカイン (第 8 図中、「SLC」) 又は C 末端切形型二次リンパ様組織ケモカイン (第 8 図中、「SLC-T」) で刺激した。既報 [ヒロセ(Hirose, J.)ら、J. Biol. Chem., 276, 5228-5234 (2001)] のように、蛍光率を測定することにより、細胞内カルシウム濃度をモニターした。前記グリコサミノグリカンとして、コンドロイチン硫酸 E (第 8 図中、「CS E」) 及びコンドロイチン硫酸 A (第 8 図中、「CS A」) を用いた。結果を第 8 図に示す。なお、第 8 図中、矢頭は、刺激を与えた時点を示す。

第 8 図に示されるように、二次リンパ様組織ケモカイン単独、又はコンドロイチン硫酸 A と共にプレインキュベートされた二次リンパ様組織ケモカインは、該二次リンパ様組織ケモカインのレセプターである CCR7 をトランスフェクトされた L1.2 細胞における顕著な  $\text{Ca}^{2+}$  動員を誘導したが、コンドロイチン硫酸 E と共にプレインキュベートされた二次リンパ様組織ケモカインは、 $\text{Ca}^{2+}$  動員を誘導しなかった。同様に、コンドロイチンポリ硫酸又はデルマタンポリ硫酸と

共にプレインキュベートされた二次リンパ様組織ケモカインは、 $\text{Ca}^{2+}$ 動員を誘導しなかった。一方、C末端切形型二次リンパ様組織ケモカインにより誘導された $\text{Ca}^{2+}$ 動員は、これらの過硫酸化CS/DS鎖のいずれによっても影響されなかった。これらの結果により、過硫酸化CS/DS鎖が、二次リンパ様組織ケモカインのC末端領域と相互作用することにより、二次リンパ様組織ケモカインの生理活性を阻害することが示唆された。

また、第8図に示されるように、これらのグリコサミノグリカンがケモカイン活性を阻害するため、過硫酸化CS/DS結合型のケモカインが、ケモカインレセプターのアゴニストとして機能せず、むしろ、過硫酸化CS/DS-ケモカイン複合体が、イン・ビボでのケモカインのリザーバーとして機能するであろうと考えられる。ケモカインと過硫酸化CS/DS鎖との相互作用において観察される遅い解離速度 ( $2.78 \times 10^{-4} \sim 5.30 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ ) は、この考えを支持する。

#### 配列表フリーテキスト

配列番号：1は、CD44遺伝子増幅用プライマーの配列を示す。

配列番号：2は、CD44遺伝子増幅用プライマーの配列を示す。


#### 産業上の利用可能性

本発明の糖化合物は、その製造の際、簡便に製造することができる。また、本発明の糖化合物によれば、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれとそのリガンドとの結合の調節、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれに介される生物学的事象の調節、該生物学的事象が発症に関連する疾患の症状の改善、並びに該疾患の治療又は予防剤のためのリード化合物の提供が可能になる。さらに、本発明の治療又は予防剤は、炎症性疾患、アレルギー性疾患、癌転移、心筋障害、多臓器不全等のL-セレクチン、P-セレクチン

ン及びケモカインのそれぞれにより介される生物学的事象が発症に関連する疾患の治療又は予防に有用である。


## 請求の範囲

## 1. 一般式 (I) :



(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  及び  $R^4$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示す)


又は、一般式 (II) :



(式中、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  及び  $R^8$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示す)


で表わされる糖化合物。

## 2. 一般式 (III) :



(式中、 $R^9$  及び  $R^{10}$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示し、 $m$  は、3 又は 4 である)

又は、一般式 (IV) :




(式中、 $R^{11}$  及び  $R^{12}$  は、それぞれ独立して、水素原子又はスルホン酸基を示し、 $n$  は、3 又は 4 である)  
で表わされる糖化合物。

3. 請求項 1 又は 2 記載の糖化合物を有効成分として含有してなる、医薬組成物。


4. 請求項 1 又は 2 記載の糖化合物を有効成分として含有してなる、L-セレクチン、P-セレクチン及びケモカインのそれぞれにより介される生物学的事象が発症に関連する疾患の治療又は予防剤。




第 1 図




## 第 2 図




## 第 2 図 ( 続 き )



## 第 2 図 ( 続 き )




第 3 図




## 第 4 図


A



## 第 4 図 (続き)




第 5 図







第 6 図




第 6 図 (続き)




第 6 図 ( 続 き )



第 7 図




第 7 図 (続き)




第 7 図 (続き)


D



C



第 8 図



SEQUENCE LISTING

<110> Taisho Pharmaceutical CO., LTD

<120> Oversulfated oligosaccharide capable of interacting with selectin a  
nd chemokine

<130> 03-016-PCT

<150> JP 2002-220301

<151> 2002-07-29

<160> 2

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 30

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Inventor: Miyasaka, Masayuki; Kawashima, Hiroto

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: a sequence of primer for ampli



fyng CD44 gene

<400> 1

tttaagctta tggacaagtt ttggtggcac

30

<210> 2

<211> 32

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: a sequence of primer for amplifying CD44 gene

<400> 2

ttttctagaa acacgtcatc atcagtaggg tt

32

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/JP03/00823

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> C12P19/14, C07H11/00, C08B37/00, A61K31/7024, A61P9/00,  
29/00, 35/04, 37/08, 43/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> C12P19/14, C07H11/00, C08B37/00, A61K31/7024, A61P9/00,  
29/00, 35/04, 37/08, 43/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
WPI (DIALOG), BIOSIS (DIALOG), MEDLINE (STN)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	KAWASHIMA H, et al., Oversulfated Chondroitin/ Dermatan Sulfates Containing GlcA $\beta$ 1/IdoA $\alpha$ 1-3 GalNAc(4,6-O-disulfate) Interact with L-and P-selectin and Chemokines. J.Biol.Chem., April 2002, Vol.277, No.15, pages 12921 to 12930	1-4
P, X	Kazuyuki ARATA et al., "L-Selectin to CD44 no Kyotsu ligand Chondroitin Ryusan Proteoglycan", Protein, Nucleic acid and Enzyme, 10 December, 2002 (10.12.02), Vol.47, No.16, pages 2214 to 2220	1-4

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier document but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search  
26 February, 2003 (26.02.03)

Date of mailing of the international search report  
11 March, 2003 (11.03.03)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C12P19/14, C07H11/00, C08B37/00, A61K31/7024,  
A61P9/00, 29/00, 35/04, 37/08, 43/00

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C12P19/14, C07H11/00, C08B37/00, A61K31/7024,  
A61P9/00, 29/00, 35/04, 37/08, 43/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI (DIALOG), BIOSIS (DIALOG), MEDLINE (STN)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	KAWASHIMA H, et al. Oversulfated Chondroitin/Dermatan Sulfates Containing GlcAβ1/IdoAα1-3GalNAc(4,6-O-disulfate) Interact with L- and P-selectin and Chemokines. J. Biol. Chem. April 2002, Vol.277, No.15, p.12921-12930	1-4
P, X	新和之他, L-セレクトインとCD44の共通リガンド コンドロイ チン硫酸プロテオグリカン, 蛋白質 核酸 酵素, 2002. 12. 10, 第47巻, 第16号, p. 2214-2220	1-4

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に関する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26.02.03

国際調査報告の発送日

11.03.03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

北村 弘樹

4B

9349

電話番号 03-3581-1101 内線 3448

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**